Λύση — Ιούλη

1) $f(x) = 2x + \ln x$ $\quad D_f$ $x > 0$

$f'(x) = 2 + \frac{1}{x} > 0$ για κάθε $D_f$

$\Rightarrow$ η $f$ είναι γν. αύξ. $\Rightarrow f^{-1} \exists$

$f$ αμφιμονοσήμαντη

Γιατί να $f(1) = 2$ τότε $f^{-1}(2) = 1$

Γιατί: $(f^{-1})(f(x)) = x \Rightarrow$

$1 = \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}\left(f^{-1}(f(x))\right) = \left[\text{κανόνας αλυσίδας}\right] =$

$= (f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) \Rightarrow (f^{-1})'(2) = (f^{-1})'(f(1)) =$

$= \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{3}$

---

2) α) $\cos(\arctan 2)$ $\alpha = \arctan 2$

$\Rightarrow 2 = \tan\alpha$, $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ και $\sin\alpha = 2\cos\alpha \Rightarrow$

$\sin^2\alpha = 4\cos^2\alpha$ Γιατί $\cos\alpha \neq 0$ Τριγ. ταυτότητα

$1 - \cos^2\alpha = 4\cos^2\alpha \Rightarrow 5\cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \cos\alpha = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}$

αλλά $\frac{\pi}{4} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ οπότε δεκτή $\boxed{\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}}$

## [Legge] – 10 set – foto

2 iv) $\lim_{x\to 0} \frac{2\sin x - \sin(2x)}{x - \tan x} = \frac{0}{0} = [\text{l'Hop}] =$

$= \lim_{x\to 0} \frac{2\cos x - 2\cos(2x)}{1 - \cos x} = \frac{0}{0} = [\text{l'Hop}] =$

$= \lim_{x\to 0} \frac{-2\sin x + 4\sin(2x)}{\sin x} =$

$= \lim_{x\to 0} \left(-2 + 8\frac{\sin x \cos x}{\sin x}\right) = 6$ [oppure [l'Hop] 2 volte]

---

3) $f(x) = \frac{e^{-x}}{\sqrt{x^2 - x - 2}} = \frac{e^{-x}}{\sqrt{(x+1)(x-2)}}$ $\quad D_f = (-\infty, -1) \cup (2, \infty)$

$\lim_{x\to -1^-} f = \infty$, $\lim_{x\to 2^+} f(x) = \infty$

$f'(x) = \dots = \frac{e^{-x}\left(-x^2 + \frac{1}{2}\right)}{(x^2 - x - 2)^{3/2}}$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\sqrt{5/2}$ | | $-1$ | | $2$ | | $\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'$ | $-\infty$ | $-$ | $0$ | $+$ | $\exists\!\!\!/$ | $+$ | $\exists\!\!\!/$ | $-$ | $0$ |
| $f$ | $\infty$ | $\searrow$ | $e^{\sqrt{5/2}}/\sqrt{\left(\sqrt{\frac{5}{2}}-1\right)\left(\sqrt{\frac{5}{2}}+2\right)}$ | $\nearrow$ | $\infty$ | $\nearrow$ | $\infty$ | $\searrow$ | $0$ |

$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \begin{cases} 0 \\ \infty \end{cases}$

$\approx 3{,}37$

$\left(-\sqrt{\frac{5}{2}},\ e^{\sqrt{5/2}}/\sqrt{\left(\sqrt{\frac{5}{2}}-1\right)\left(\sqrt{\frac{5}{2}}+2\right)}\right)$

$-\sqrt{5/2}$